

Bezpečný produkt na motolice


Motolice (Fasciola Hepatica) je plochý červ lokalizovaný v játrech.

Tento parazit hloubí chodby, které jsou nevratným poškozením a časem zvažpenatí. Přítomnost motolic v játrech tak snižuje jejich detoxikační kapacitu. Vývojový cyklus motolice prochází přes plovatku, malého plže, vyskytujícího se na vlhkých pastvinách.



Nákaza pod kontrolou:

Studie na nakažených dospělých ovcích*



*Pokus byl veden na 13 ovcích :

- 3 ovce byly poraženy v den 0 s parazitární bilancí: kompletní pitva jater k vyhledání všech dospělých motolic – celkem 10 dospělých jedinců na třech ovcích.
 - 2 skupiny po 5 ovcích : Kontrola bez PARACLEANU a pokus s PARACLEANEM v dávce 10 g denně v průběhu 10 dní. Všechny ovce poraženy ve 100 dnech s kompletní parazitární bilancí jater.
 - 17 motolic celkem u ovčí ve skupině bez PARACLEANU
 - 3 motolice celkem u 4 ovčí ze skupiny se PARACLEANEM
- Parazitární bilance byla provedena krajskou laboratoří v Corrèze pod dohledem veterináře.

- ➔ PARACLEAN se podílí na prevenci výskytu motolic u přežvýkavců omezením přítomnosti dospělých motolic v játrech.
- ➔ Aktivita zvládání tohoto parazita je charakterizována snížením výskytu živých motolic o 82 % ve zkoumaných játrech v rámci pokusu provedeného v roce 2016 u silně napadených ovčí.

Kompletně přírodní a lehce použitelný produkt

➔ Více než 10 rostlin známých jejich odpuzujícím účinkem:

pískavice, pelyněk pravý, kaprad' samec, pelyněk cicvárový, mateřídouška, tykev, fenykl, vratič, ...



➔ Návod k použití / doporučené dávkování

- » Mladý dobytek a koně lehčího typu: 40 g denně 6-10 dní
- » Dospělý skot a koně: 50 g denně 6-10 dní
- » Ovce a kozy: 15 g denně 6-10 dní
- » Lesní zvěř – 10g/ 100kg živé váhy.

Je-li třeba opakuje po 3 týdnech.

➔ Balení:

10kg kbelík
Jeden kbelík pro:
20 - 33 ks u dospělého skotu,
25 - 44 ks u mladého dobytka,
případně 66 - 111 ks ovčí a koz.



Aplikováno
u více než
150 000
krav

Použitelné v podmínkách
ekologického zemědělství

PARACLEAN



Doplňkové krmivo pro skot, ovce, kozy a koně



PARACLEAN přispívá k vyrovnanému vnitřnímu prostředí zvířat díky extraktům z 10 rostlin známých jejich odpuzujícím účinkem na vnitřní parazity.



Dodavatel:
Guyokrma spol. s r.o.
Žirovnická čp. 2389
106 00 Praha 10

Tel.: +420 272 652 875
Fax: +420 272 653 146

guyokrma@guyokrma.cz
www.guyokrma.cz

Širokospektrální produkt

Technický produkt
na střevní hlísty

Inovativní produkt
na motolici bachorovou

PARACLEAN

V přirozeném prostředí žijí přežvýkavci a parazité v relativní harmonii. Dojde-li k přerušení této rovnováhy, zvíře se ocitá v nebezpečí.

Hlavní parazité přítomní ve zvířeti jsou zodpovědní za infekce, často zákeřné a chronické, které postihnou produkci a pohodu zvířat: růst, plodnost a produkce jsou také zpomaleny.

Jeho metody působení na parazitický cíl jsou zásadní pro:

- Umožnit skotu rozvinout silnou imunitu pro zvýšení výkonnosti
- Zabránit rozvoji rezistencí určitých parazitů na anti-parazitika
- Chránit prostředí a životnost dlouhodobých pastvin


POUŽITELNÝ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ,
Paraclean napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu zvířat, chrání jejich imunitní systém při zachování dobré kvality mléka a masa

Nákaza zažívacími hlísty je problém, se kterým se často setkáváme při vyhánění na pastvu, kdy může negativně ovlivnit správný vývoj mladých zvířat.



Časově lépe zvládnutá nákaza:

Aktivita PARACLEAN na střevní hlísty u mladého dobytka*




*Pokus srovnával vyměšování vajíček střevních hlístů u 16 jalovic rozdělených do 2 skupin (skupina kontrolní/skupina PARACLEAN) před a po distribuci, do žlabu na pastvě, při dávkování PARACLEAN 60 g denně během 6 dní. Jalovice nebyly v průběhu pastvy chemicky odčervovány. Byly prováděny individuální odběry výkalů ke koprologii.

- Vliv kontrované nákazy střevními hlísty přinesl průkazné snížení parazitárního vylučování ve výkalech.
- Toto se blíží úrovni 90% účinnosti.




Motolice bachorová je parazit, který zásadně ovlivňuje výkonnost trávení. Větší přítomnost tohoto parazita bude obtěžovat zvířata (jeho dlouhověkost dosahuje 5-7 let) v důsledku čehož dochází ke kumulativní nákaze. Včasným zásahem zabráníme vývoji parazita vytvořením pro něj nepříznivých podmínek.



Rychlé vyloučení motolice z trávicího traktu:

Aktivita PARACLEAN na motolici u krav*



*Pokus srovnával vyměšování vajíček motolic u 16 krav rozdělených do 2 skupin (skupina kontrolní/skupina PARACLEAN) před a po distribuci, do žlabu na pastvě, při dávkování PARACLEAN 60 g denně během 6 dní. Jalovice nebyly v průběhu pastvy chemicky odčervovány. Byly prováděny individuální odběry výkalů ke koprologii.

- PARACLEAN kontroluje aktivitu motolic přítomných v bachorech i u skupiny silně napadené.
- Řízení aktivity těchto parazitů je vyjádřeno snížením vylučování vajíček motolic o 81%.